hospital EVANGÉLICO
Cachoeiro de Itapemirim

PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR RESIDÊNCIA MÉDICA 2025 - HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

HECI - EDITAL Nº 04/2024 e EDITAL Nº 01/2025

ACESSO DIRETO

203 - NEUROLOGIA

204 - MEDICINA DE EMERGÊNCIA

ORIENTAÇÕES

1. Prezado(a) candidato(a), favor conferir se o caderno recebido corresponde a **ÁREA | ESPECIALIDADE** para a qual você está concorrendo. Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal antes do início desta prova.
2. Este Caderno de Prova, contém **25 (Vinte e cinco)** questões objetivas, com 4(quatro) alternativas cada uma, sempre na sequência **A**, **B**, **C**, **D**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha. Confira-o e, em caso de qualquer problema, informe **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
3. Após a conferência, **ASSINE** conforme documento oficial apresentado e **MARQUE** seu tipo de prova, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
4. A duração da prova será **de 2h (duas horas)**, inclusos, nesse tempo, a distribuição da prova, a leitura das instruções e o preenchimento da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar os horários estabelecidos.
5. **Período de Sigilo** – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida **01 (uma) hora** do início das provas.
6. Os candidatos não poderão se ausentar da sala ou do local de provas para utilização dos banheiros ou beber água, antes de decorrida **01 (uma) hora do início** ou **15 (quinze) minutos** antes do término.
7. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova mediante a **entrega obrigatória de sua Folha de Respostas e do Caderno de Prova**, devidamente preenchida e assinada, ao Fiscal.
8. Ao término do prazo estabelecido para a prova, **os 03(três) últimos candidatos** deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas e somente poderão deixar o local de provas, juntos, não sendo possível nem mesmo a utilização do banheiro e bebedouro.
9. Os candidatos **NÃO PODERÃO** levar consigo o Caderno de Prova.
10. O gabarito estará disponível no endereço eletrônico **novo.ibgpconcursos.com.br** no dia **26/02/2025** a partir das **20h**.

A Comissão Examinadora do IBGP Concursos lhe deseja uma boa prova!

IBGP
Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 01

A respeito dos tipos de linfadenectomias, correlacione a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, relacionando o conceito com suas definições.

COLUNA I

1. Linfadenectomia D1
2. Linfadenectomia D2
3. Linfadenectomia D3
4. Linfadenectomia paliativa

COLUNA II

A. Indicado em casos avançados e sem cura
B. Retirada de gânglios perigástricos
C. Retirada de gânglios perigástricos e peripancreáticos
D. Extensão dos gânglios do tronco celíaco

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de respostas:

A) 1B- 2C- 3D- 4A
B) 1A- 2B- 3C- 4D
C) 1C- 2A- 3B- 4D
D) 1D- 2B- 3C-4A

QUESTÃO 02

Um homem de 36 anos de idade apresenta dor intensa ao evacuar e relato de sangramento em pequena quantidade no papel higiênico. Ao exame físico, observa-se uma lesão linear de, aproximadamente, 1cm no canal anal posterior. O paciente já foi tratado com laxantes e banhos de assento, sem melhora significativa.

Nesse caso, o **PRÓXIMO** passo terapêutico mais adequado é:

A) Aumentar a ingesta de fibras e novo ciclo de laxantes.
B) Aplicar toxina botulínica no esfíncter anal interno.
C) Realizar esfincterotomia lateral interna.
D) Realizar anuscopia e biópsia da lesão.

QUESTÃO 03

Um jovem de 26 anos de idade chega ao Pronto-Socorro, após acidente automobilístico, taquicárdico e hipotenso, sem sinais de lesões visíveis.

Nesse caso, o **PRINCIPAL** mediador da resposta inflamatória ao trauma é:

A) Interleucina-1.
B) Fator de necrose tumoral (TNF).
C) Cortisol.
D) Proteína C reativa.

QUESTÃO 04

Um homem de 71 anos de idade apresenta dor abdominal súbita e intensa, associada à distensão e vômitos. Nesse caso, a hipótese diagnóstica **MAIS** provável é:

A) Apendicite.
B) Pancreatite.
C) Diverticulite.
D) Obstrução intestinal.

QUESTÃO 05

Em relação ao câncer de vesícula biliar, todas alternativas estão corretas, **EXCETO**:

A) A colecistectomia incidental é a principal forma de diagnóstico precoce.
B) A vesícula em porcelana está associada ao aumento do risco de câncer.
C) A icterícia obstrutiva é comum em estágios iniciais.
D) O adenocarcinoma é o tipo histológico mais comum.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 06

Um homem de 55 anos de idade, portador de doença arterial coronariana crônica, apresenta, após intensa emoção, dor torácica precordial e perda da consciência. Os pulsos periféricos não são perceptíveis e a pressão arterial não foi percebida.

Nesse caso, o mecanismo **PROVÁVEL** da parada cardíaca é:

A) Assistolia.
B) Taquicardia supraventricular.
C) Fibrilação ventricular.
D) Fibrilação atrial.

QUESTÃO 07

Sobre as formas de apresentação do tromboembolismo pulmonar (TEP), analise as afirmativas a seguir:

I. O TEP será chamado de maciço ou de alto risco, quando o paciente apresenta instabilidade hemodinâmica e já foram descartados diagnósticos diferenciais.
II. Os pacientes que não apresentam hipotensão ou uso de vasopressor cursam com sintomas leves ou não possuem quaisquer sintomas são classificados como de baixo risco.
III. O TEP intermediário consiste naqueles casos em que o paciente não apresenta disfunção ventricular direita e não há resposta ao tratamento ofertado, associado à ressuscitação volêmica.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e III.
D) I, II e III.

QUESTÃO 08

Uma mulher de 51 anos de idade é encaminhada para investigação, devido à elevação de fosfatase alcalina. Os exames realizados evidenciaram a presença de anticorpos antimitocondriais, além de HDL elevado.

Nesse caso, o diagnóstico **MAIS** provável é:

A) Cirrose biliar primária.
B) Colangite esclerosante.
C) Doença de Wilson.
D) Hepatite autoimune.

QUESTÃO 09

Um enfermo de 70 anos de idade, portador de neoplasia, é admitido no Serviço de Emergência, com queixa de febre e cefaleia. Ao exame, encontra-se confuso, sem sinais de localização, com rigidez de nuca, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Pulso: 68bpm, PA: 160 x 100mmHg, T.ax: 38,8°C, frequência respiratória: 24irpm.

É **CORRETO** afirmar que, nesse caso, o quadro apresentado pelo enfermo deve-se, principalmente, ao seguinte agente:

A) Neisseria meningitidis.
B) Listeria monocytogenes.
C) Haemophilus influenzae.
D) Staphylococcus aureus.

QUESTÃO 10

Sobre a avaliação laboratorial, em caso de anemia, considere as afirmativas a seguir:

I. A realização de hemograma completo, creatinina e coagulograma, quando diante de sinais de coagulopatia, é crucial no departamento de emergência.
II. A presença de desidrogenase láctica baixo e haptoglobina alta são indicativos de anemia hemolítica, e o teste de Coombs positivo aponta para anemias autoimunes.
III. O RDW (*Red Cell Distribution Width*) geralmente está aumentado e associado à presença de trombocitose, policromasia, esferócitos e esquizócitos, além da própria reticulocitose, nas anemias hemolíticas.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e III.
D) I, II e III.

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

QUESTÃO 11

Em relação aos critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde para uso de contraceptivos hormonais, é **CORRETO** afirmar:

A) Os contraceptivos hormonais combinados podem ser usados, sem riscos, nas primeiras semanas pós-parto, em pacientes que não estão amamentando.
B) Está contraindicado o uso de anticoncepcionais combinados em pacientes usuárias de antirretrovirais.
C) Em pacientes com sangramento irregular, deve-se dar preferência ao uso de contraceptivos hormonais progestínicos.
D) Apenas as pílulas de progestínicos podem ser indicadas para pacientes com doenças cardíacas.

QUESTÃO 12

Em relação ao tratamento do câncer de ovário, considere as afirmativas a seguir e assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

(_) A quimioterapia neoadjuvante consiste na inversão das formas de tratamento para o câncer de ovário, ou seja, preconiza-se o emprego do tratamento quimioterápico prévio à cirurgia citorredutora, particularmente em pacientes portadoras de doenças que contraindiquem um ato operatório extenso ou que possuam doença avançada comprometendo a citorredução.

(_) A quimioteapia de intervalo está indicada nos casos em que se efetua a reexploração do abdome, após o término da quimioterapia, com o intuito de evidenciar a presença de tumor, quando métodos de acompanhamento (marcadores tumorais ou exames de imagem) não o fazem.

(_) O termo "cirurgia de second look" é usado nos casos em que a citorredução à primeira cirurgia é tida como insatisfatória, quando, então, considera-se a realização de três ciclos de quimioterapia previamente a uma reabordagem operatória.

(_) A cirurgia de citorredução secundária diz respeito a quaisquer operações após a cirurgia primária, objetivando nova citorredução diante da recidiva tumoral.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de respostas:

A) V – F – F – V
B) V – V – F – F
C) F – V – V – F
D) F – F – V – V

QUESTÃO 13

Paciente é examinada na triagem em período expulsivo e é constatada apresentação pélvica completa em sacropúbica. Opta-se por parto vaginal espontâneo.

Nesse caso, a conduta **RECOMENDADA** para o desprendimento dos ombros e pólo cefálico é:

A) Manobra de Deventer-Müller.
B) Manobra de Bracht.
C) Abstenção de manobras, apenas manter a nádega e o tronco elevados.
D) Rotação do feto e realizar a manobra de Pajot.

QUESTÃO 14

O tratamento do diabetes gestacional leve reduziu significativamente todos os desfechos adversos a seguir, **EXCETO**:

A) Distocia de ombro.
B) Pré-eclâmpsia.
C) Mortalidade perinatal.
D) Macrossomia fetal.

QUESTÃO 15

Uma paciente de 61 anos de idade apresentava carcinoma ductal invasivo de mama direita, de 7cm de diâmetro, sem linfonodos palpáveis e sem evidências de metástases à distância. Foi indicada quimioterapia neoadjuvante e, após o tratamento, o tumor sofreu redução, atingindo 3cm de diâmetro. A axila continuava livre clinicamente.

Neste momento, a conduta cirúrgica **ADEQUADA** é:

A) Quadrantectomia mamária com linfonodectomia axilar.
B) Mastectomia com biópsia do linfonodo sentinela.
C) Mastectomia com linfonodectomia axilar.
D) Quadrantectomia mamária com biópsia do linfonodo sentinela

PEDIATRIA

QUESTÃO 16

Um menino de 9 anos de idade é admitido com história de febre, dor abdominal e diminuição do volume urinário nas últimas 48 horas. A mãe relata que ele teve uma faringite estreptocócica tratada há duas semanas.

Ao exame físico, apresenta edema generalizado, pressão arterial de 145/95mmHg e estertores pulmonares. Os exames laboratoriais mostram creatinina sérica de 3,2mg/dL (nível basal desconhecido), ureia de 90mg/dL e uma análise de urina com proteinúria significativa e hematúria.

A causa **MAIS** provável da insuficiência renal aguda nesse paciente é:

A) Necrose tubular aguda.
B) Nefrite intersticial aguda.
C) Glomerulonefrite pós-estreptocócica.
D) Síndrome hemolítico-urêmica.

QUESTÃO 17

Uma criança de 11 anos de idade, vegetariana estrita, apresenta fadiga, palidez e glossite. Os exames laboratoriais revelam hemoglobina de 7,5g/dL, VCM de 112fL e níveis de vitamina B12 de 80pg/mL.

Nesse caso, o diagnóstico **MAIS** provável é anemia:

A) Ferropriva.
B) Megaloblástica.
C) Falciforme.
D) Aplástica.

QUESTÃO 18

Um recém-nascido, nascido a termo e sem complicações aparentes, durante o parto, começa a apresentar salivação excessiva e dificuldade para alimentar-se logo nas primeiras horas de vida. A mãe relata que ele parece engasgar e tossir durante a amamentação. O exame físico mostra estertores difusos e desconforto respiratório leve. Ao tentar passar uma sonda nasogástrica, percebe-se que a sonda não avança além de 10cm da boca. Uma radiografia de tórax com contraste é realizada e o contraste se acumula na região proximal do esôfago.

Nesse caso, o diagnóstico **MAIS** provável é:

A) Estenose pilórica congênita.
B) Refluxo gastroesofágico severo.
C) Hérnia diafragmática congênita.
D) Atresia de esôfago com fístula traqueoesofágica.

QUESTÃO 19

Um menino de 8 anos de idade é admitido no Hospital com quadro de febre alta, dor abdominal e diarreia sanguinolenta há 3 dias. Os exames laboratoriais revelam leucocitose com desvio à esquerda e cultura de fezes positiva para *Escherichia coli*.

Nesse caso, o médico está considerando o tratamento com antibióticos, mas está preocupado com possíveis complicações, em razão do antibiótico:

A) Aumentar o risco de síndrome hemolítico-urêmica.
B) Induzir resistência bacteriana.
C) Não ser eficaz contra bactérias Gram-negativas.
D) Causar choque séptico em infecções por Gram-negativos.

QUESTÃO 20

No que se refere à complexa rede de interações psicossociais da criança, assinale a alternativa **CORRETA:**

A) No período pré-escolar, a interação entre crianças é indiferente ao desenvolvimento infantil, devendo-se evitar a ida das crianças para creches.
B) Deve-se evitar a presença de outros cuidadores, além dos pais, nos primeiros anos de vida, para não prejudicar o vínculo entre pais e filhos, mesmo em famílias estáveis e com relações satisfatórias.
C) Instabilidade emocional materna não é fator de risco para desenvolvimento de psicopatologia na vida adulta da criança.
D) Quando há discordância entre as fontes de informação sobre as crianças, o pediatra deve considerar que a variação do comportamento pode refletir a interação da criança em diferentes contextos.

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

QUESTÃO 21

Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **CORRETA**:

A) Os municípios não podem formar consórcios para desenvolver ações de saúde.
B) No nível municipal, o SUS pode organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos voltados para a cobertura das ações de saúde.
C) Sua direção é composta pelos secretários de saúde e diretores dos hospitais conveniados.
D) No âmbito da União, é competência do Ministério do Trabalho a direção do SUS.

QUESTÃO 22

É **CORRETO** afirmar que a reforma sanitária consiste em:

A) Um movimento pela reorganização dos serviços de saúde, racionalizando-os.
B) Um movimento de reestruturação da sociedade brasileira, tomando, como exemplo, o setor de saúde.
C) Uma reforma completa das leis sanitárias.
D) Uma reforma no Ministério da Saúde.

QUESTÃO 23

A Constituição Brasileira de 1988, em relação à assistência à saúde prestada pela iniciativa privada, estabeleceu que:

A) A assistência à saúde é vetada à iniciativa privada naquelas regiões do país onde as ações do poder público forem suficientes para dar cobertura a toda assistência necessária à população.
B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, desde que estas últimas estejam instaladas em regiões não cobertas por serviços públicos.
C) Não há restrições à participação de empresas ou capital estrangeiro na assistência à saúde no Brasil.
D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada e pode participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 24

A respeito das etapas para a prática clínica baseada em evidências, correlacione a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, relacionando o conceito com suas definições.

	COLUNA I		**COLUNA II**
1.	Etapa 1	( )	Avaliação crítica e sistematizada da qualidade e da confiança nas evidências disponíveis.
2.	Etapa 2	( )	Avaliação de desempenho.
3.	Etapa 3	( )	Estruturação da pergunta de interesse a partir de uma situação prática.
4.	Etapa 4	( )	Avaliação da validade externa (aplicabilidade) e incorporação dos resultados à prática.
5.	Etapa 5	( )	Identificação e busca do tipo de estudo mais apropriado para responder à pergunta.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de respostas:

A) 2 — 4 — 5 — 3 — 1
B) 3 — 5 — 1 — 4 — 2
C) 1 — 5 — 2 — 4 — 3
D) 5 — 1 — 3 — 2 — 4

QUESTÃO 25

Uma criança, no segundo grau de desnutrição, adquiriu sarampo e veio a falecer com septicemia após contrair broncopneumonia. Nesse caso, é **CORRETO** afirmar que:

A) A causa básica do óbito foi o sarampo.
B) A causa mortis do óbito foi o sarampo.
C) A causa básica do óbito foi a septicemia.
D) A causa mortis do óbito foi a desnutrição de segundo grau.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.